
云南农垦热作病虫害监测与防控简报

(2026 年第 11 期)

云南农垦热作病虫害监测与防控项目组

2026 年 9 月 10 日

雨季橡胶园内涝风险预警及灾后应对建议

一、植胶区近期主要灾害风险情况

8 月底 9 月初，受西南季风和沿海台风以及全球厄尔尼诺现象的持续影响，整个植胶区降水量虽与常年平均水平差异不大，但单次强降水天气出现较频繁。各监测站点的数据显示，西双版纳州景洪市周边植胶区、勐腊县各农场和民营胶园出现多次强降水天气，短时雨量集中、雨势迅猛，勐腊县少数地势低洼的林段出现内涝，少数河边林段出现路基冲毁的情况。

二、未来天气趋势预测

日前，国家气候中心最新监测结果显示，本次厄尔尼诺现象因海温偏暖幅度大，即将达到“超强”级别。本次超强厄尔尼诺事件的影响预计持续至 2027 年夏季。国家气候中心副主任高荣预计，受厄尔尼诺影响，秋季我国长江流域及以南大部分地区降水以偏多为主，其中西南地区东部降水明显偏多，发生极端降水事件的概率大。因此，未来一段时间，植胶区仍有局部集中强降

雨天气出现的风险，植胶区低洼、沟口附近林段仍有内涝风险存在，需要注意防范。

三、处理建议

橡胶树是一种不耐水淹的树木，对于发生内涝的胶园，应在降雨结束后及时排水。可通过开挖排水沟将水排出，若遇到地势特别低洼无法排水的胶园，可使用抽水设备排水。对于垮塌的道路要及时进行修缮，对于倒伏的树木及时进行清理。此外，对于受灾胶园，灾后需要适当降低割胶强度，或适当停割，有助于橡胶树的恢复。

此外，降雨频繁，湿度较大，有利于季风性落叶病和割面条溃疡病的发生，各监测站点应加强监测工作，发现病情及时进行处理。病情特点和处理方式详见“云南农垦热作病虫害监测与防控简报第 10 期”。

（数据收集和分析得到了国家天然橡胶产业技术体系西双版纳、红河、德宏综合试验站、云南省天然橡胶产业技术体系以及省天然橡胶产业专家组的支持）

（拟稿：孔祥东 审核：张永科）